

## **ПАТОЛОГІЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ**

**Піддубна А.І.**

*Сумський державний університет, м. Суми*

Шлунково-кишковий тракт відноситься до систем, що постійно уражаються у хворих на ВІЛ-інфекцію. Різноманітні види патології з проявами діареї виявляються у 30-50 % пацієнтів. Діарея обумовлена як прямою дією вірусу, так і токсичною дією ліків, суперінфекціями. Мета роботи - дослідити частоту та характер ураження шлунково-кишкового тракту у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, що знаходилися на лікуванні в СОІКЛ ім. З.Й. Красовицького.

Результати. З 2001 р. по 2008 р. у СОІКЛ ім. З.Й. Красовицького під наглядом знаходилось 95 хворих у віці від 16 до 44 років з діагнозом “ВІЛ-інфекція”. Клінічні прояви патології шлунково-кишкового тракту в більшості випадків були обумовлені діареєю, що тривала понад місяць, дисфагією, здуттям живота, болем в епігастрії та гіпогастрії, зменшенням маси тіла. На пронос з частотою до 5 разів на добу скаржилися 20 (21 %) пацієнтів; більше 5 разів – 4 (4,2 %). У 58 (61 %) осіб було діагностовано дисбактеріоз кишківника: з них І ступеня – 19 осіб, II – 29, III – 10. Зменшення маси тіла відмічалось у 28 (29,5 %) осіб: до 10 % - у 9, понад 10 % - у 14, у 5 випадках діагностовано ВІЛ-обумовлену кахексію. Серед супровідної патології найбільшу питому вагу мали прояви холециститу у 38,9 % випадків (клінічно та за даними УЗД), дискінезії жовчо-вивідних шляхів за гіпокінетичним типом (27,4 %), панкреатиту (5,3 %), жовчо-кам'яної хвороби (3,2 %). 1 випадок госпіталізації був пов'язаний з шлунково-кишковою кровотечею. Висновки. У ВІЛ-інфікованих відмічається значна частота ураження шлунково-кишкового тракту. Найбільш розповсюджені скарги: діарея, біль у епі- та гіпогастрії, зменшення маси тіла. В структурі захворюваності провідне місце належить дисбактеріозу, що був діагностований у 61 % пацієнтів. Серед супровідної патології найчастіше виявлялися холецистит, дискінезія жовчо-вивідних шляхів за гіпокінетичним типом, панкреатит.